

SORTENEMPFEHLUNG

Sorte	AG	Sorte	AG
Dt. Weidelgras früh			
Artonis (t)	6, 7	Barmultra II (t)	6, 7
Arvicola (t)	6, 7	Dorike (t)	6, 7
Cooky (t)	6, 7	Gemini (t)	6, 7
Mirtello (t)	6, 7	Kingsgreen (t)	6, 7
Salmo (t)	6, 7	Lyrik (t)	6, 7
Soronia (t)	6, 7	Melsprinter (t)	6, 7
Dt. Weidelgras mittel			
Allodia (t)	6, 7	Orythus (t)	6, 7
Barcampo (t)	6, 7	Oryx	6, 7
Barojet (t)	6, 7	Rulicar (t)	6, 7
Bellator	6, 7	Sendero	6, 7
Einjähriges Weidelgras			
Boccacio (t)	6, 7	Arnoldo (t)	6, 7
Botond (t)	6, 7	Bendix (t)	6, 7
Boyne	6, 7	Jumper (t)	6, 7
Diwan (t)	6, 7	Meljump (t)	6, 7
Explosion (t)	6, 7	Ramiro	6, 7
Garbor (t)	6, 7	Volubyl	6, 7
Festulolium			
Matenga (t)	6, 7	Achilles (t)	6, 7
Ozia (t)	6, 7	Fedoro (t)	6, 7
Tribal (t)	6, 7	Felopa (t)	6, 7
Zambezi (t)	6, 7	Mahulena (h)	6, 7
Dt. Weidelgras spät			
Barganza (t)	6, 7	Paulita (t)	6, 7
Barmigo (t)	6, 7	Perseus (t)	6, 7
Wiesenschwingel			
Chevalier (t)	6, 7	Baltas	6, 7
Dressano (t)	6, 7	Barvital	6, 7
Hurricane (t)	6, 7	Cosmolit	6, 7
Kentaur (t)	6, 7	Cosmonaut	6, 7
Melfrost (t)	6, 7	Cosmopolitan	6, 7
Meltador (t)	6, 7	Liherold	6, 7
Nashota (t)	6, 7	Pardus	6, 7
Novello (t)	6, 7	Pradel	6, 7
Polim (t)	6, 7	Preval	6, 7
Salvina (t)	6, 7		
Wiesenschnittgras			
Sputnik	6, 7	Aturo	6, 7
Valerio (t)	6, 7	Comer	6, 7
Bastardweidelgras			
Enduro (t)	6, 7	Lischka	6, 7
Ibex (t)	6, 7	Polarking	6, 7
Leonis (t)	6, 7	Rasant	6, 7
Melcombi (t)	6, 7	Rubato	6, 7
Palio (t)	6, 7	Summergraze	6, 7
Rusa (t)	6, 7		

Sorte	AG	Sorte	AG
Knautgras			
Aldebaran	6, 7	Alpha	6, 7
Barlegro	6, 7	Catera	6, 7
Diceros	6, 7	Dakota	6, 7
Dragoner	6, 7	Daphne	6, 7
Lyra	6, 7	Fee	6, 7
Revolin	6, 7	Fiesta	6, 7
Treposno	6, 7	Fleetwood	6, 7
Rotklee			
Blizard (t)	6, 7	Fraver	6, 7
Carbo (t)	6, 7	Fusion	6, 7
Fregata (t)	6, 7	Hybriforce 2400	6, 7
Larus (t)	6, 7	Planet	6, 7
Magellan (t) 1)	6, 7	Plato	6, 7
Monsun (t)	6, 7	Sanditi	6, 7
Taifun (t) 1)	6, 7	Verko	6, 7
Tempus (t)	6, 7		
Titus (t) 1)	6, 7		
Tornado (t)	6, 7		

Glatthafer, Persischer Klee

Alle in der aktuellen „Beschreibenden Sortenliste Futtergräser, Esparsette, Klee, Luzerne“ aufgeführten Sorten

AG = Anbaugbiet
 (t) = tetraploide Sorte (h) = haploide Sorte
 1) = nicht in Stängelbrennerbefallslagen geeignet

Herausgeber: Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum
 Naumburger Str. 98, 07743 Jena
 Tel.: 0361 574041-000, Fax: 0361 574041-390
 Bearbeiter: Harald Hegner, harald.hegner@tlllr.thueringen.de
 Dorit Zopf, dorit.zopf@tlllr.thueringen.de


Jena, im April 2022

Copyright:
 Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die des Nachdruckes von Auszügen und fotomechanische Wiedergabe sind dem Herausgeber vorbehalten.

Thüringer Qualitäts-Saatmischungen für den Ackerfutterbau

(mit Eignung für KULAP und ÖVF)

2022/23



EIGNUNG DER QUALITÄTS-SAATMISCHUNGEN

einsömrriger, mehrschnittiger Ackerfutterbau		
Saattermin	März/April	
vorwiegende Nutzungseignung:	A2	Silage, Heu
	1.1.	Silage, Heu
	1.2.	Frischfutter
überjähriger, mehrschnittiger Ackerfutterbau		
Saattermin	Ende Juli bis Anfang September	
vorwiegende Nutzungseignung:	A1	Silage, Heu
	2.1.	Silage, Heu
	2.2.	Silage, Heu
	2.3.	Silage
	2.4.	Frischfutter
zwei- und mehrjähriger Ackerfutterbau		
Saattermin	März/April	
vorwiegende Nutzungseignung:	3.1.	Frischfutter, Silage, Heu
	3.2.	Silage, Heu
	3.3.	Frischfutter
	3.4.	Frischfutter, Silage, Heu
	3.5.	Frischfutter
	3.6.	Silage, Heu
	3.7.	Silage, Heu
	3.8.	Silage, Heu
	3.9.	Silage, Frischfutter, Heu
	3.10.	Silage, Frischfutter, Heu

Die Qualitäts-Saatmischungen für den Ackerfutterbau berücksichtigen langjährige praktische Erfahrungen sowie Versuchsergebnisse und entsprechen den Standortbedingungen im Freistaat Thüringen.

ANBAUGEBIETE FÜR DEN MEHRSCHNITTIGEN ACKERBAUBETRIEB

6 – sommertrockene Lagen
< 350 m über NN
< 600 mm Jahresniederschlag
> 8 °C Jahresdurchschnittstemperatur der Luft
7 – günstige Übergangslagen
350–600 m über NN
600–800 mm Jahresniederschlag
6–8 °C Jahresdurchschnittstemperatur der Luft

THÜRINGER QUALITÄTS-SAATMISCHUNGEN FÜR DEN ACKERFUTTERBAU

	einsömrriger und überjähriger Ackerfutterbau					
	Saatmenge (kg/ha)					
	einsömrrig			überjährig		
	A2	1.1.	1.2. K	A1*	2.1.	2.2. K
Einjähriges Weidelgras	15	40	5			
Welsche Weidelgras	30		5	30–40	20	6
Persischer Klee			10			
Rotklee					8	12
Gesamt (kg/ha)	45	40	20	30–40	28	18
Empfohlen für Anbaugebiet	6, 7	6, 7	7	6, 7	7	7

* Aussaatstärke 30 kg/ha bei diploiden Sorten, bei tetraploiden je nach Anteil bis 40 kg/ha

	zwei- und mehrjähriger Ackerfutterbau									
	Saatmenge (kg/ha)									
	3.1. K	3.2.	3.3.	3.4. K	3.5. K	3.6. K	3.7. K	3.8. K	3.9. K	3.10. K
Bastardweidelgras/Festulium		16	20							
Deutsches Weidelgras		4		3						
Wiesenschwingel	9			10			6	6	5	6
Wiesenlieschgras	3			2				2	2	2
Knautgras					2	4				
Glatthafer						3	2			2
Rotklee	13	8	8	13					6	7
Luzerne					18	13	12	10	7	8
Gesamt (kg/ha)	25	28	28	28	20	20	20	18	20	25
Empfohlen für Anbaugebiet	7	7	7	7	6	6	6	6	6, 7	6, 7

Reinsaat		
Reinsaat (12 kg/ha)	Luzerne	Rotklee
Empfohlen für Anbaugebiet	6	7

Gemenge mit Körnerleguminosen (empfohlen für KULAP, ökologische Vorrangfläche [ÖVF] und alle Anbaugebiete)							
Art	Saatmenge (kg/ha)	Art	Saatmenge (kg/ha)	Art	Saatmenge (kg/ha)	Art	Saatmenge (kg/ha)
Ackerbohne	mind. 150	Wintererbse	mind. 40	Sommererbsen	mind. 80	Blaue Lupine	mind. 80
Getreide (auch mehrere)	max. 100	Wintergetreide (auch mehrere)	max. 100	Sommergetreide (auch mehrere)	max. 80	Getreide (auch mehrere)	max. 80
Wintertriticale, Winterweizen bzw. Hafer, Triticale		Winterweizen, Wintertriticale, Winterroggen		Hafer, Sommergerste		Sommergerste, Hafer	

Mischungen mit der Bezeichnung „A“ werden in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und empfohlen. Die Mischungen 1.2. (QA 4), 3.1. (QA 5), 3.4. (QA 6), 3.6. (QA 7), 3.9. (QA 8) und 3.10. (QA 10) werden in Thüringen und Sachsen empfohlen. Die Empfehlung der anderen Mischungen gilt nur für Thüringen.

K = für KULAP bzw. ÖVF geeignet (empfohlen)